

4

ရက်ချစ်အာ-မေ့



ကြိုအာက 10 ရက် အာက
တံဝ်တံဝ်အာကအာကအာကအာက

Cage and observe the dog or cat
for 10 days, if it dies, submit this to the
nearest laboratory for rabies examination.

ခွေး ကြိုအာက အာကအာကအာကအာက
ကကြိုအာကအာကအာကအာကအာက
တံဝ်တံဝ်အာကအာကအာကအာက


5

ကရ်နီတံဝ်အာက အာက

တံဝ်အာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက

Immediately notify a veterinarian
or officer if the dog die.

အာကအာက အာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက



ရက်ချစ်-အာက
အာကအာကအာကအာက
တံဝ်အာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာက



If/being bitten or scratched by the dog,
Do not be at ease, you must go to see the doctor,
or you would be killed.

အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက

အာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက



You may die if the rabies vaccination
is performed not consistent to the schedule.

အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက



ကရ်နီတံဝ်အာက
Department of Disease Control

အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက
အာကအာကအာကအာကအာကအာက



5 ယ

အာကအာကအာကအာကအာကအာက

အာကအာကအာကအာကအာကအာက



4



ရိက္ခာခံစား-မေး

ရောဂါကူးစက်မှု 10 ရက် အတွင်း
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
Cage and observe the dog or cat
for 10 days, if it dies, submit this to the
nearest laboratory for rabies examination.

ခွေး ကြောင်အား ထိမ်းသိမ်းထားပြီး ၁၀ ရက်
အတွင်း ကြည့်ပါ။ သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
စစ်ဆေးရန် ပေးပို့ရမည်။

5



ရောဂါကူးစက်မှု သေဆုံး
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
Immediately notify a veterinarian
or officer if the dog die.

အကယ်၍ တိရစ္ဆာန်တွင် ခွေးရူးပိုးရောဂါရှိသည်ဟု
သံသယရှိပါက သို့မဟုတ် သေဆုံးသွားပါက
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့သို့ အကြောင်းကြားပါ။
အရာရှိအား အကြောင်းကြားပါ။



ရောဂါကူးစက်မှု-ချွန်
ရောဂါကူးစက်မှု
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ



If/being bitten or scratched by the dog,
Do not be at ease, you must go to see the doctor,
or you would be killed!

သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ
သေဆုံးပါက ခွေးရူးပိုးရောဂါ

ရောဂါကူးစက်မှု
ရောဂါကူးစက်မှု
ရောဂါကူးစက်မှု



You may die if the rabies vaccination
is performed not consistent to the schedule.

ခွေးရူးပိုးရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပါ သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း
ထိုးမှန်မှန်ထိုးပါက အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။



Ministry of Public Health
Department of Disease Control



๗1

อย่าเหยย
สุนัขให้โมโห



๗2

อย่าเหยียบ
หาง หัว ตัว ขา หรือ
ทำให้สุนัขตกใจ



๗3

อย่าแหยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



๗4

อย่าหยิบ
จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร
ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



๗5

อย่ายุ่ง
หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูกสุนัขรื้อแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้



1

ล้างแผลให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง
อย่างเบามือ
ล้างสบู่ออกให้หมด
เช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยารักษาแผลสด

2

จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อ
สืบหาเจ้าของ/
กักหมา-แมว
ไว้ดูอาการ 10 วัน
สอบถามประวัติ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



3


ไปหาหมอหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง



สุนัขกัด ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา
นานพอ ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด



โรคพิษสุนัขบ้า



ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง
จากการถูกสุนัขกัด

“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

3 ไท ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า :

- ให้ความรู้
- ให้วัคซีน
- ให้เมืองไทยปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า



โรค



พิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยพบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือแมว

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ ปวดท้องน้อยและ ขากล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาตหมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไป จากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด



คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัข




1

นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)



2

ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง




3

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องทำหมัน ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



หยุดปล่อยหมา

หยุดปัญหาหมาจรจัด



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อกัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่อ่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

“โรคนี้ไม่มีทกงรักษาให้หายได้”

หากมีอาการแล้ว ตายทุกราย